



Pets Protector 90

Protección que se renueva con cada estación.



Fluralaner 40%
Antiparasitario externo
para el control y prevención
de pulgas y garrapatas



**Días de
Protección**



**Comprimido
Palatable**



Antiparasitario externo para el control y prevención de pulgas y garrapatas

FÓRMULA:

Comprimidos 275 mg: Fluralaner 110 mg, excipientes c.s.p. 275 mg.
Comprimidos 625 mg: Fluralaner 250 mg, excipientes c.s.p. 625 mg.
Comprimidos 1250 mg: Fluralaner 500 mg, excipientes c.s.p. 1250 mg.
Comprimidos 2000 mg: Fluralaner 800 mg, excipientes c.s.p. 2000 mg.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Pets protector 90 son comprimidos palatables, apetecibles para las mascotas gracias a sus excipientes especialmente diseñados que facilitan la ingestión voluntaria. Pets protector 90 es un insecticida sistémico de duración prolongada que mata de forma inmediata las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* adultos y jóvenes) y pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*). Sobre pulgas y garrapatas posee una actividad que persiste durante 12 semanas. Se puede aplicar como parte del tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picaduras de pulgas (DAPP). Además, ayuda al control de la pulga en el ambiente donde habita el hospedador. El producto reduce la transmisión de *Babesia canis* en perros al actuar contra su vector, *Rhipicephalus sanguineus*. Un solo tratamiento reduce el riesgo de transmisión de *Dipylidium caninum* por la pulga *C. felis* en perros, o la transmisión del protozooario *Babesia canis* por un período de 12 semanas. La prevención de la transmisión de agentes ocurre al eliminar rápidamente al parásito previo a que éste sea capaz de transmitir los agentes infecciosos.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Pets protector 90 comprimidos palatables se administra por vía oral. Debe administrarse junto con el alimento o inmediatamente después de éste, el alimento mejora la absorción del activo. Si se produce el vómito durante la hora siguiente a su administración y la tableta es visible, debe administrarse una nueva dosis completa para garantizar la máxima eficacia del producto.

DOSIS: De acuerdo al peso del animal, administrar: Ver cuadro. Intervalo entre dosis: 12 semanas. Duración del tratamiento: Para un control óptimo de pulgas y garrapatas se debe administrar el producto a intervalos de 12 semanas.

ESPECIES INDICADAS: Caninos.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Efectos gastrointestinales leves y transitorios, tales como diarrea, vómitos, inapetencia y salivación frecuentemente. Se han notificado letargia, temblor muscular, ataxia y convulsiones en muy raras ocasiones. El producto no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. Utilizar con precaución en perros con epilepsia preexistente. El medicamento veterinario no debe administrarse a intervalos inferiores a 8 semanas ya que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. Puede utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU ADMINISTRACIÓN: El medicamento se debe mantener en su envase original hasta su utilización. Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para quedar expuestos al fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse totalmente el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos (incluida *Babesia canis*). Administrar junto con alimento o inmediatamente después de éste. Debe considerarse que la duración de la eficacia podría verse reducida si el producto se administra con el estómago vacío. En caso de necesidad de destrucción del producto y/o sus envases por vencimiento u otra causa, la misma se realizará de acuerdo a la normativa local vigente.

FARMACODINAMIA DEL PRODUCTO: Fluralaner, es una isoxazolina que pertenece a un nuevo grupo de parasiticidas, potente inhibidor del sistema nervioso de los artrópodos ya que actúa de forma antagónica en los canales de cloruro regulados por ligando (receptor GABA y receptor glutamato). En estudios moleculares dirigidos sobre los receptores GABA de pulgas y moscas, el fluralaner no se vio afectado por la resistencia al dieldrín.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN LOS ANIMALES: Las reacciones adversas más frecuentes del fluralaner en estudios de tolerancia en perros fueron: Vómito, pérdida de apetito, diarrea, letargo, sed excesiva y flatulencia. Posibles reacciones neurológicas adversas tras el uso de productos con isoxazolininas en perros como temblores musculares, ataxia (falta de coordinación de movimientos musculares) y convulsiones. El fluralaner no tiene un antídoto específico. Proceder a tratamientos sintomáticos y de apoyo según los síntomas predominantes.

CONSERVACIÓN: Conservar al resguardo de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

PRESENTACIÓN	PESO DEL COMPRIMIDO (MG)	APORTE DEL FLURALANER (MG)	DOSIS (MG/KG)	
2 a 4,4 kg	275	110	25	55
4,5 a 10 kg	625	250	25	55,56
10,1 a 20 kg	1250	500	25	49,50
20,1 a 32 kg	2000	800	25	39,80
32,1 a 64 kg	2000 (2 unidades)	1600	25	49,84

SENASA Cert.: 23-121 | Elaborado por: **Productos Veterinarios S.A.** | Est. Elab. N° 8567 - Ruta 168
Paraje El Pozo - Lote B1 - Parque Tecnológico del Litoral
Centro (SAPEM) (3000) Ciudad de Santa Fe - Argentina
Tel. fax.: +54 0342-4511500
info.argentina@ceva.com - www.zoovet.com.ar

Centro Nacional de Intoxicaciones en Arg.: 0800 3330160

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos - Venta con receta veterinaria - INDUSTRIA ARGENTINA - CONSULTE A SU VETERINARIO - USO VETERINARIO - Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

20240410-PETSPROTECTOR90-P