

VADEMÉCUM

Animales de compañía



Juntos, más allá de la Salud Animal

ANALGÉSICOS - ANESTÉSICOS



Algicam Pets Injectable

Fórmula: meloxicam 5 mg/ml.
Acción: analgésico – antiinflamatorio.
Indicaciones: tratamiento del dolor e inflamación asociados al sistema músculo esquelético.
Dosis: inicial 0,2 mg/kg, continuando con 0,1 mg/kg cada 24 hs.
Vía de administración: subcutánea.
Presentación: frasco 50 ml.



Carprodol

Fórmula: carprofeno 75 / 100 mg.
Acción: antiinflamatorio – analgésico.
Indicaciones: alivio del dolor y de la inflamación en caninos.
Dosis: 2,2 mg/kg 2 veces al día o 4,4 mg/kg cada 24 hs.
Vía de administración: oral.
Presentación: caja con 21 comprimidos.



Algidol Dúo

Fórmula: tramadol 75 mg, glucosamina 425 mg.
Acción: analgésico, condrotrófico.
Indicaciones: tratamiento y prevención del dolor somático.
Dosis: tramadol 1 a 3 mg/kg, glucosamina 5 a 17 mg/kg.
Vía de administración: comprimidos orales.
Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 5 comprimidos.



Diazepam

Fórmula: diazepam 5 mg/ml.
Acción: tranquilizante, ansiolítico, miorelajante.
Indicaciones: tranquilizante, ansiolítico, miorelajante, anticonvulsivante.
Dosis: 0,2 a 0,4 mg/kg.
Vía de administración: endovenosa, intrarectal.
Presentación: frasco 20 ml y 50 ml.



Eutanásico

Fórmula: pentobarbital sódico 39%, difenilhidantoína 5%.
Acción: agente eutanásico.
Indicaciones: eutanasia rápida, indolora y humanitaria.
Dosis: perros 1 ml/5 kg, gatos: 0,2 ml/kg.
Vía de administración: endovenosa, intracardíaca.
Presentación: frasco x 15 ml.



Prednovet

Fórmula: prednisolona 20 mg.
Acción: antiinflamatorio esteroide.
Indicaciones: alergias, artropatías, estados inflamatorios, enfermedades inmunomediadas.
Dosis: 1 a 2 mg/kg
Vía de administración: oral.
Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 10 comprimidos.

ANTIBIÓTICOS



ATB Listo

Fórmula: penicilina G procaínica 15000000 UI, penicilina G benzatínica 15000000 UI, dihidroestreptomina 14208000 UI en 100 ml.
Acción: antimicrobiano de amplio espectro.
Indicaciones: tratamiento de procesos infecciosos provocados por microorganismos sensibles a penicilina G, dihidroestreptomina y/o su combinación.
Dosis: 1 ml/15 kg. Cada 48 o 72 hs.
Vía de administración: intramuscular profunda.
Presentación: frasco 100 ml.



Cefalong

Fórmula: cefalexina 500 mg o 1000 mg.
Acción: ATB de amplio espectro.
Indicaciones: infecciones de piel, tracto urinario, respiratorio y gastrointestinales.
Dosis: 22 a 30 mg /kg cada 8 ó 12 hs.
Vía de administración: oral.
Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 8 comprimidos de 500 mg, caja hospitalaria de 30 fp. X 5 comprimidos de 1000 mg.



Ciproplus Gel Ótico


Fórmula: ciprofloxacina clorhidrato 0.8%, prednisolona 0.25%, ketoconazol 2%, lidocaína clorhidrato 2%.
Acción: antimicrobiano, antifúngico, antiinflamatorio, analgésico de uso tópico.
Indicaciones: otitis externas bacterianas, fúngicas, o alérgicas.
Dosis: 0,5 ml en cada oído cada 24 hs.
Vía de administración: tópica en el canal auditivo externo.
Presentación: jeringa por 10 ml.



Doxivit

Fórmula: comprimidos que contienen 100 mg. de doxiciclina, tiamina clorhidrato 5 mg, piridoxina clorhidrato 1 mg, cianocobalamina 5 µg, ácido fólico 5 mg. Comprimidos que contienen 200 mg. de doxiciclina, tiamina clorhidrato 10 mg, piridoxina clorhidrato 2 mg, cianocobalamina 10 µg, ácido fólico 10 mg.
Acción: antimicrobiano – vitamínico.
Indicaciones: tratamiento de enfermedades anemizantes en perros y gatos. Infecciones por ehrlichia canis y mycoplasmas. Enfermedades respiratorias como bordetelosis, amigdalitis y enfermedad respiratoria felina. Doxivit incorpora vitaminas que favorecen la recuperación clínica del animal.
Dosis: comprimidos de 100 mg. 1 c/ 10 k.p.v. Comprimidos de 200 mg. 1 c/ 20 k.p.v.
Vía de administración: oral.
Presentación: caja hospitalaria de 12 fp. X 10 comprimidos de Doxivit 100 mg, caja hospitalaria de 12 fp. X 5 comprimidos de Doxivit 200 mg.

ANTIBIÓTICOS



Doxin

Fórmula: doxiciclina hclato 4,6%.

Acción: antimicrobiano de amplio espectro para bacterias Gram (+) y Gram (-).

Indicaciones: tratamiento de ehrlichiosis, bordetella, micoplasma, rickettsiosis entre otras.

Dosis: 5 mg /kg cada 12 hs ó 10 mg/kg cada 24 hs.

Vía de administración: endovenosa lenta o intramuscular.

Presentación: frasco 50 ml.



Enroplus Comprimidos

Fórmula: enrofloxacin 50, 100 o 150 mg según presentación.

Acción: antimicrobiano de amplio espectro (quinolona).

Indicaciones: tratamiento de infecciones causadas por Gram (+) y Gram (-) y micoplasma, en tracto respiratorio, digestivo, dérmico y urinario. No aplicar a animales en crecimiento, hembras en gestación ni lactantes.

Dosis: 5 mg/kg cada 24 hs.

Vía de administración: oral.

Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 10 comprimidos.

ANTIMICÓTICOS



Itraconazol Suspensión

Fórmula: itraconazol 1%.

Acción: antimicótico sistémico.

Indicaciones: micosis sistémicas superficiales y profundas, dermatofitosis.

Dosis: 5 a 10 mg/kg.

NOTA: admite tratamiento por pulsos.

Vía de administración: oral.

Presentación: frasco gotero por 15 ml.



Itraconazol Comprimidos

Fórmula: itraconazol 100 mg.

Acción: antimicótico sistémico.

Indicaciones: micosis sistémicas profundas y superficiales, dermatofitosis.

Dosis: 5 a 10 mg/kg.

NOTA: admite tratamiento por pulsos.

Vía de administración: oral.

Presentación: caja premium x 10 comprimidos, caja hospitalaria de 12 fp. X 10 comprimidos.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



Pets protector MAX Spot On

Fórmula: fipronil 10% y metopreno 10%.

Acción: antiparasitario externo.

Indicaciones: pulguicida (ovicida y larvicida), garrapaticida.

Dosis: 1 pipeta por animal según peso cada 28 días. Puede administrarse en gestantes y lactancia.

Vía de administración: spot on.

Presentación: caninos - cajas individuales de 2 a 5 kg, de 5 a 10 kg, de 10 a 20 kg, de 20 a 40 kg, de 40 a 60 kg. Felinos - cajas individuales de hasta 4 kg de peso.



Spinomax Dúo

Fórmula: spinosad 27% lufenurón 10%.

Acción: antiparasitario externo.

Indicaciones: pulguicida. Combina la rápida acción adulticida del spinosad con la actividad ovicida y larvicida del lufenurón sobre el ciclo ambiental de la pulga.

Dosis: 1 o 2 comprimidos por animal según su peso. Dosis administrada 30 mg. k.p.v. de spinosad, 10 mg. k.p.v. de lufenurón.

Vía de administración: oral.

Presentación: cajas individuales según el peso de 2 a 4 kg, de 4 a 9 kg, de 9 a 18 kg, de 18 a 36 kg y de 36 a 70 Kg.



Pets Protector 90

Fórmula: fluralaner 40%.

Acción: antiparasitario externo con 90 días de efecto.

Indicaciones: infestaciones por pulgas y garrapatas.

Dosis: 1 o 2 comprimidos por animal según su peso. Dosis administrada entre 25 y 56 mg. k.p.v.

Presentación: cajas individuales de 2 a 4,4 kg, de 4,5 a 10 kg, de 10,1 a 20 kg, de 20,1 a 32 kg, de 32,1 a 64 kg.



P.I. - Pipeta Imidacloprid

Formula: imidacloprid 10%.

Acción: insecticida, pulguicida, piojicida.

Indicaciones: pulguicida para felinos y caninos.

Dosis: 1 pipeta por animal, según peso cada 21 días.

Vía de administración: tópica, spot on.

Presentación: cajas individuales de hasta 4 kg y más de 4 kg.



Pets Protector Spray

Fórmula: fipronil 0,25% - metopreno 0,25%.

Acción: antiparasitario externo.

Indicaciones: pulguicida (ovicida y larvicida), garrapaticida.

Vía de administración: tópica (spray).

Presentación: 100 ml y 250 ml.



Rocky Curabicheras Crema

Fórmula: fipronil 0,25 gr, clorhexidina 0,5 gr. Vehículo con aceite de pino y pasta de aluminio.

Acción: antiparasitario externo, curabicheras.

Indicaciones: tratamiento de miasis, antiséptico.

Dosis: según criterio veterinario, cada 24hs.

Vía de administración: tópica.

Presentación: pomada de 60 gr.

FEROMONAS



Adaptil Calm Difusor Adaptil Classic Recambio

Fórmula: análogo de la feromona de apaciguamiento canino 2%.

Hidrocarburo isoparafínico c.s.p 100g.

Acción: al liberar la feromona continuamente está indicado para proporcionar bienestar constante y confort en el hogar.

Indicaciones: mudanzas, ruidos fuertes, animales que están muchas horas solos, pensionados. **Dosis:** un frasco de 48 ml dura hasta 30 días (con un flujo de aire controlado, y sin variaciones energéticas) y cubre un área de 70 m².

Vías de administración: difusión ambiental.

Presentación: difusor con frasco de 48 ml. Repuesto de 48 ml.



Adaptil Calm On the Go Collar

Fórmula: análogo de la feromona de apaciguamiento canino 5%. Excipientes c.s.p 100%.

Acción: ayuda a los perros a sentirse cómodos en situaciones estresantes que generen comportamientos inapropiados, incluso al aire libre.

Indicación: adiestramiento, sociabilización, reacciones relacionadas con el miedo expresadas fuera del hogar (por ejemplo, tráfico vehicular, otros perros, mudanzas, etc).

Dosis: collar S para perros con un perímetro de cuello de hasta 37,5 cm o hasta 15 kg.

Collar M/L: para perros con un perímetro de cuello de hasta 62,5 cm o hasta 50 kg.

Vías de administración: por contacto, la feromona se va liberando por el calor corporal del perro.

Presentación: collar small - collar medium/large.



Adaptil Transport Spray

Fórmula: análogo de la feromona de apaciguamiento canino 2%. Excipientes c.s.p 100%.

Acción: ayuda a los perros a sentirse cómodos en situaciones estresantes que generen comportamientos inapropiados.

Indicaciones: viajes, visitas al veterinario, peluquerías, pensionados, ruidos y demás situaciones estresantes.

Dosis: para viajes colocar dentro del carrier 15 minutos antes de introducir al perro. Se coloca una aplicación en cada vértice. Volver a aplicar cada 4 a 5 hs. Para consultorios: colocar sobre mantas como refuerzo de la acción del difusor antes de que llegue el paciente.

Vías de administración: spray ambiental.

Presentación: frasco spray por 60 ml.



Feliway Classic Difusor Feliway Classic Recambio

Fórmula: análogo de la fracción F3 de la feromona facial 2%. Hidrocarburo isoparafínico c.s.p. 100g.


Acción: ayuda a los gatos a sentirse cómodos en situaciones estresantes que generen comportamientos inapropiados.

Indicación: al liberar la feromona continuamente está indicado para proporcionar bienestar constante y confort en el hogar.

Dosis: un frasco de 48 ml dura hasta 30 días (con un flujo de aire controlado, y sin variaciones energéticas), y cubre un área de 70 m².

Vías de administración: difusión ambiental.

Presentación: difusor con frasco de 48 ml. Repuesto de 48 ml.



Feliway Classic Spray

Fórmula: análogo de la fracción F3 de la feromona facial 10%. Etanol c.s.p 60 ml.

Acción: ayuda a los gatos a sentirse cómodos en situaciones estresantes que generen comportamientos inapropiados.

Indicaciones: miedo, marcajes con orina, arañazos, esconderse mucho.

Dosis: para viajes rociar dentro del transportador, un disparo en cada ángulo, 15 minutos antes de poner al animal. Volver a aplicar cada 5 a 6 hs. Para marcaje por orina; limpieza apropiada y rociar 1 vez cada 12 hs. Para marcaje por arañazos: limpieza apropiada y rociar 6 veces cada 12 hs.

Vías de administración: aspersión sobre el ambiente.

Presentación: spray por 60 ml.



Feliway Friends Difusor Feliway Friends Recambio

Fórmula: análogo de la feromona de apaciguamiento felino 2%. Hidrocarburo isoparafínico c.s.p 100g.

Acción: reduce el estrés y los conflictos entre gatos que conviven.

Indicaciones: ayuda a que los gatos que conviven estén en armonía, disminuyendo los conflictos y tensión entre los mismos. Uso en gatos gerontes.

Dosis: un frasco de 48 ml dura hasta 30 días (con un flujo de aire controlado, y sin variaciones energéticas), y cubre un área de 70 m².

Vías de administración: difusión ambiental.

Presentación: difusor con frasco de 48 ml. Repuesto de 48 ml.

ANTIPARASITARIOS INTERNOS



Albex

Fórmula: albendazol 500 mg, prazicuantel 50 mg.

Acción: antiparasitario interno.

Indicaciones: parasitosis internas, causadas por nematodos y cestodos.

Dosis: Albendazol 50 mg/kg - Prazicuantel 5 mg/kg (1 comprimido cada 10 kg). Cada 24 hs 2 días. Trichuriasis 3 a 5 días.

Vía de administración: oral.

Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 10 comprimidos.



Tri Vermex Comprimidos

Fórmula: comprimidos chicos - fenbendazol 250 mg, pamoato de pirantel 25 mg y prazicuantel 25 mg. Comprimidos grandes - fenbendazol 500 mg, pamoato de pirantel 50 mg y prazicuantel 50 mg.

Acción: antiparasitario interno de amplio espectro.

Indicaciones: parasitosis internas producida por nematodos y cestodos.

Dosis: 1 comprimido chico cada 5 kg de peso en dosis única. 1 comprimido grande cada 10kg de peso en dosis única.

NOTA: trichuriasis 1 dosis diaria por 3 a 5 días.

Presentación: caja premium de 20 kg y de 40 kg. Caja hospitalaria de 12 fp. X 4 comprimidos para 40 kg.

ANTIPARASITARIOS INTERNOS



SUSPENSIÓN ORAL

Tri Vermex Suspensión

Fórmula: fenbendazol 5%, pamoato de pirantel 1.45% y prazicuantel 0.5%.

Acción: antiparasitario interno de amplio espectro.

Indicaciones: parasitosis internas producidas por nematodos y cestodos.

Dosis: 1 ml por kg de peso. En cachorros repetir a los 14 o 21 días.

Presentación: frasco por 15 ml y frascos por 100 ml.

SUPLEMENTOS MINERALIZANTES



COMPRIMIDO

Artrovet Plus

Fórmula: glucosamina sulfato 500 mg, sulfato de manganeso 10 mg, condroitín sulfato 100 mg.

Acción: condroprotector.

Indicaciones: artritis, artrosis, artropatías degenerativas, condropatías, tendinitis.

Dosis: caninos 1 comprimido cada 15 kg cada 24 hs. Felinos ¼ de comprimido cada 5 kg, cada 24 hs.

Vía de administración: oral.

Presentación: caja hospitalaria de 30 fp. X 5 comprimidos.

HIGIENE Y BELLEZA



ORAL

Bucal Vet

Fórmula: clorhexidina al 20% (0,01%) – xylitol 0,5%.

Acción: prevención de enfermedades periodontales y halitosis.

Indicaciones: enfermedad gingival, periodontal y halitosis.

Dosis: 10 ml. cada 1 litro de agua de bebida o su dilución proporcional.

Vía de administración: enjuague bucal – oral.

Presentación: frasco 100 ml y 250 ml.



TÓPICO SPOT ON

Shampoo con Clorhexidina

Fórmula: clorhexidina digluconato (al 20%) 8%.

Indicaciones: limpieza de piel y pelo, antiséptico.

Acción: shampoo para dermatitis seborreicas y/o bacterianas.

Indicaciones: antiséptico, bactericida, antimicótico.

Dosis: comenzar con 30 ml de shampoo cada 3 días y continuar según evolución.

Vía de administración: vía tópica, shampoo.

Presentación: frasco por 350 ml.

HORMONALES



COMPRIMIDO

Sincelar Comprimidos

Fórmula: clormadinona acetato 2 mg.

Acción: anticonceptivo.

Indicaciones: interrupción del estro, anticonceptivo, alteraciones del ciclo ovárico.

Dosis: posponer el estro, 0,2 mg/kg/24 hs, 1 comprimido cada 10 de p.v. por 4 semanas.

Suspensión del estro 1 comprimido cada 5 kg/p.v/24 hs, durante 8 a 10 días.

Vía de administración: oral.

Presentación: caja hospitalaria de 40 fp. X 10 comprimidos.



INYECTABLE

Sincelar Inyectable

Fórmula: medroxiprogesterona acetato 5%.

Acción: anticonceptivo.

Indicaciones: prevención del estro en caninos y felinos.

Dosis: felinos: 1 ml. Caninos hasta 30 kg 1 ml. Caninos más de 30 kg 1,5 ml.

Repetir cada 5 meses en anestro.

Vía de administración: subcutáneo.

Presentación: frasco multidosis 10 ml. Caja de 10 ampollas por 1 ml.



COMPRIMIDO

T.I.U.

Fórmula: estriol 1 mg.

Acción: tratamiento de la incontinencia urinaria hormonodependiente.

Indicaciones: tratamiento de la incontinencia urinaria hormonodependiente.

Dosis: no existe una relación entre el peso y la dosis efectiva. Se aconseja comenzar con 1 mg cada 7 días, si el tratamiento es efectivo, administrar 0,5 mg durante una semana y evaluar respuesta. Si el tratamiento inicial no da resultado, duplicar la dosis por 7 días y evaluar. Si no responde reevaluar la causa.

Vía de administración: oral.

Presentación: cajas con 30 comprimidos.



Escanea el QR y conocé más de Ceva Salud Animal

Juntos, impulsamos
soluciones innovadoras
para la salud
de todos los animales
contribuyendo al futuro
de nuestro planeta.



#neHealth #nePlanet #neCeva